

Igenomix es el único laboratorio de España que ofrece este test con una validación científica con casuística propia.

niPOC

Non-Invasive
Products of Conception

by Igenomix®

En caso de
pérdida
gestacional
es necesario
conocer los
motivos

Igenomix®

PART OF VITROLIFE GROUP™



50%

El 50% de las pérdidas gestacionales en el primer trimestre de embarazo son debidas a anomalías cromosómicas.

En casos de aborto, esta información puede ayudarte a ti y a tu médico a mejorar el manejo de tu siguiente embarazo.

Las pérdidas gestacionales en el primer trimestre de embarazo suceden con cierta frecuencia. Uno de cada dos abortos espontáneos ha sido causado por anomalías cromosómicas, y este dato alcanza el 60% en mujeres en tratamiento de reproducción asistida*.

Cada célula del ser humano contiene 46 cromosomas que se organizan en 23 pares. 23 cromosomas provienen del padre y los otros 23 de la madre.

Las anomalías cromosómicas se producen cuando el número de cromosomas es incorrecto o por una pérdida o exceso de material cromosómico. Estas anomalías pueden producir abortos espontáneos.

El **niPOC** es un avanzado test no invasivo que, a través de un análisis de sangre, determina si una pérdida gestacional fue causada por una anomalía cromosómica.

En función del resultado obtenido, esta información puede ayudarte a ti a tu médico a decidir los siguientes pasos para lograr el éxito de tu embarazo:



*(Martínez et al., 2010; Campos-Galindo et al., 2015; Al-Asmar, 2018)

¿Por qué el niPOC te ofrece más ventajas que otros estudios tradicionales?

- **No invasivo:** no tendrás que pasar por quirófano ya que no se necesita recogida de los restos fetales: **solo se necesita una muestra de sangre.**
- **Rápido:** resultados disponibles entre 3 y 7 días laborables, frente a 1 mes con los test convencionales.
- **Más informativo:** resultados en mas del 85% de los casos, frente al 50% con los test convencionales.

¿Cómo puede ayudarte el niPOC?

- El nuevo test niPOC ofrece información genética para un asesoramiento reproductivo más preciso, lo que permite planificar futuros embarazos con mayor seguridad y confianza.
- Está especialmente indicado para personas en tratamiento de **reproducción asistida** ya que te proporciona información útil para un tratamiento futuro.

¿Cómo realizar el test?

Realizarse el test niPOC es muy sencillo: solo se necesita una extracción de sangre materna. Sin embargo, es importante realizar la prueba lo antes posible una vez confirmada la interrupción del embarazo, y siempre antes de que se produzca la expulsión de restos abortivos.



Igenomix[®]
PART OF VITROLIFE GROUP

*Es imperativo que este paso se realice antes de la expulsión espontánea, evacuación instrumental, legrado o el tratamiento farmacológico para la expulsión o reabsorción del producto de la gestación.

El test niPOC PASO A PASO

1. Habla con tu médico para saber si este test es conveniente para ti.
2. Realiza la extracción de sangre.
3. Igenomix recoge y traslada la muestra al laboratorio.
4. Resultados de 3 a 7 días laborales desde la recepción de la muestra.



Extracción
de sangre

24
horas



Muestra llega
a Igenomix

de 3 a 7
días



Entrega
de resultados

96 390 53 10

De lunes a viernes de 8 a 20 h.



supportspain@igenomix.com

www.igenomix.es